

언어구분 KOR

논문구분 원저/구연

논문분야 종양

논문제목 연부 조직 육종 무계획적 절제의 임상적 특징 및 치료 결과

영문제목 **Clinical Features And Results Of Unplanned Excisions in Soft Tissue Sarcoma**

발 표 자 이재후

책임저자 조용진

저 자 이재후, 신규호, 김승현, 조용진

기 관 명 연세대학교 의과대학 정형외과학교실

서론 : 악성 연부조직 종양이라는 의심 없이 무계획적으로 절제한 후 육종으로 판명되어 전원 된 환자에서 임상적 특징과 치료 결과를 알아보고자 하였다.

재료 및 방법 : 악성 연부조직 종양이라는 의심 없이 무계획적으로 절제한 후 육종으로 판명되어 전원 된 환자에서 임상적 특징과 치료 결과를 알아보고자 하였다.

결과 : 남자 18명 여자 12명이었으며, 평균 43세(17~60세)였다. 종괴의 위치는 상지가 6례, 하지가 20례, 체간이 4례 였으며, 평균 10개월(1~60개월)의 증상 지속기간을 보였다. 종괴가 천층에 위치한 경우와 깊이 위치한 경우는 각각 16례, 14례로 그 빈도가 비슷했다. 술 전 이미지 검사 없이 무계획적 절제술을 시행한 경우가 6례, 초음파 검사만 시행한 경우가 10례, MRI 를 시행한 경우가 4례 였다. 무계획적 절제술과 재절제 술까지 소요 기간은 평균 10주(3주~1년)이었다.

결론 : 크기가 작은 종괴에서 무계획적인 절제가 빈번히 일어나며, 이것은 가급적 피해야 하나 무계획적 절제 후에도 광범위 절제연으로 절제한다면 재발을 줄일 수 있을 것으로 생각된다.

acknowledgment :

연부조직육종, 재절제, 무계획적 절제
